

لا إله إلا الله
محمد عبده



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری حرفه‌ای پزشکی عمومی

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیر تامسولوسین در پیشگیری از احتباس ادراری بعد از جراحی سزارین در بیماران

مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال ۱۳۹۶

اساتید راهنما :

دکتر حمید رضا باغانی اول

دکتر بهناز سوییزی

استاد مشاور :

دکتر ژيلا آگاه

نگارش :

علیرضا آبادی

آبان ۱۳۹۶

صورت جلسہ ہیئت داوران:

عنوان: بررسی تاثیر تامسولوسین در پیشگیری از احتباس ادراری بعد از جراحی سزارین در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال ۱۳۹۶
اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا باغانی اول دکتر بهناز سوییزی
استاد/اساتید مشاور: دکتر ژيلا آگاه
تاریخ دفاع: ۱۳۹۶/۸/۱
نمره پایان نامه: ۱۸/۶۲
کد اخلاق: IR.MEDSAB.REC.1395.116
کد ثبت پایان نامه: ۹۵۰۷۷
شماره ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی (برای مطالعات کارآزمایی بالینی): IRCT2017092036287N1
حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و استفاده از مطالب متن، جدول ها، نمودارها و شکل ها بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

تعهدنامه اصالت:

سپاس می‌گویم به آنها که مهر آسمانشان آرا منخش

آلام زمینی ام است...

تقدیم بہ

پدر بزرگوارم کہ چون چراغی را ہما بر خطہ خطہ می عمرم تظارہ کر

است...

بہ سبزترین نگاہ زندکیم، چشمان پر محبت مادرم بہ پاس ہمہ می محبت

ما و فداکاری ہمیش...

و تقدیم بہ ہمسر عزیزم دکتر الہہ فہمی

کہ لطف و محبت بی دریغش، ہموارہ پایہ دلکرمی من است.

می ستیّمش، او که در وجودش هر روز آرامشی افزون می یابم.
تقدیم به خواهران عزیزم عاطفه و فاطمه زهرا آبادی که وجودشان
مایه دلگرمی من می باشد.

و تقدیم به همه دردمندانی که جامه سپیدم را صبورانه پذیرفتند؛ آن هاییکه بر بستر دردشان
دانش و تجربه آموختم.

تقدیر و تشکر:

شکر و سپاس خداوند متعال را که توفیق داد این پایان

نامه را به سرانجام برسانم از خداوند منان توفیق و

سعادت همه پویندگان و رهروان علم و دانش را

خواهانم.

این تحقیق ساده که امید است پایه های یک تحقیق

وسیع باشد، با همکاری بی دریغ و بزرگوارانه استادان

محترم، جناب آقای دکتر باغانی و سرکار خانم دکتر

بهناز سوینری و دکتر ژیلدا آگاه صورت گرفته است؛

عزیزانی که کاستی های علمی مرا تحمل نموده و با صبر و

تشکیلی یاریم نمودند.

لذا خالصانه از این بزرگواران قدردانی نموده و توفیق

روز افزون ایشان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه و بیان مسأله.....	۲
۱-۱-۱- سزارین.....	۲
۱-۱-۲- شیوع سزارین.....	۳
۱-۱-۳- دلایل افزایش میزان سزارین.....	۴
۱-۱-۴- بیهوشی در سزارین.....	۴
۱-۱-۵- احتباس ادراری.....	۵
۱-۱-۶- احتباس ادراری بعد از عمل.....	۶
۱-۱-۷- شیوع احتباس ادراری.....	۶
۱-۱-۸- ریسک فاکتور ها.....	۷
۱-۱-۹- درمان احتباس حاد ادراری.....	۸
۱-۱-۱۰- عوارض احتباس ادراری بعد از عمل.....	۸
۱-۱-۱۱- آلفابلوکر ها.....	۹
۱-۲- اهداف پژوهش.....	۱۰
۱-۲-۱- هدف کلی تحقیق.....	۱۰
۱-۲-۲- اهداف اختصاصی تحقیق.....	۱۰
۱-۲-۳- فرضیات و سوالات تحقیق.....	۱۱
۱-۲-۴- جدول متغیر ها.....	۱۲

فصل دوم: اهداف و فرضیات

۲-۱- مروری بر مطالعات پیشین.....	۱۴
----------------------------------	----

فصل سوم: مواد و روش ها

۱۹	۳-۱-نوع مطالعه.....
۱۹	۳-۲-جامعه مطالعه.....
۱۹	۳-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری.....
۱۹	۳-۴-روش انجام پژوهش.....
۲۰	۳-۵-معیار ورود به مطالعه.....
۲۰	۳-۶-معیار خروج از مطالعه.....
۲۱	۳-۷-روش تجزیه و تحلیل آماری.....
۲۱	۳-۸-ملاحظات اخلاقی.....
۲۱	۳-۹-شیوه گرد آوری اطلاعات.....
۲۱	۳-۱۰-ابزار گرد آوری اطلاعات.....

فصل چهارم: نتایج

۲۳	۴-۱-نتایج.....
----	----------------

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری

۳۱	۵-۱-بحث.....
۳۴	۵-۲-نتیجه گیری.....
۳۴	۵-۳-پیشنهاد ها و راهکارها.....
۳۵	منابع.....

فهرست جداول

- جدول ۴-۱- فراوانی متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه در زنان دو گروه..... ۲۳
- جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار سن و سن حاملگی در بیماران دو گروه مورد مطالعه..... ۲۵
- جدول ۴-۳- فراوانی سابقه بیماری در زنان دو گروه مورد مطالعه..... ۲۶
- جدول ۴-۴- فراوانی نوع بیهوشی و احتباس ادراری در زنان دو گروه مورد مطالعه..... ۲۸

فهرست نمودار

- نمودار ۱-۴ - فراوانی تحصیلات در دو گروه مداخله و کنترل ۲۴
- نمودار ۲-۴ - فراوانی سابقه زایمان و نوع زایمان در دو گروه مداخله و کنترل ۲۵
- نمودار ۳-۴ - میانگین و انحراف معیار سن و سن حاملگی در بیماران دو گروه مورد مطالعه ۲۶
- نمودار ۴-۴ - فراوانی سابقه بیماری در زنان دو گروه مورد مطالعه ۲۷
- نمودار ۵-۴ - فراوانی نوع بیهوشی و احتباس ادراری در زنان دو گروه مورد مطالعه ۲۸

فهرست پیوست ها

پیوست شماره یک: فرم جمع آوری داده ها ۴۲

پیوست شماره دو: فرم رضایت نامه شرکت در طرح..... ۴۳

چکیده:

عنوان: بررسی تاثیر تامسولوسین در پیشگیری از احتباس ادراری بعد از جراحی سزارین در بیماران مراجعه

کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال ۱۳۹۶

مقدمه: احتباس حاد ادراری یک اورژانس اورولوژیک می باشد. احتباس ادراری بعد از عمل یکی از رایج ترین عوارض بعد از جراحی است. مطالعات اخیر مزایای استفاده از دارو های آلفابلوکر را در جلوگیری از احتباس ادراری بعد از عمل نشان داده است. هدف از این مطالعه به منظور مقایسه اثر پیشگیرانه تامسولوسین در مقایسه با دارونما بر احتباس ادرار پس از عمل می باشد.

مواد و روش ها: این یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور می باشد. این مطالعه بر روی ۱۵۲ بیمار که تحت جراحی سزارین الکتیو قرار گرفته اند انجام شده است. بیماران به دو گروه ۷۶ نفری تقسیم شده و به گروه اول (مداخله) ۳ دوز دارو تامسولوسین ۰/۴mg به صورت ۶ ساعت قبل از عمل، قبل از بیهوشی، و ۶ ساعت بعد از عمل و به گروه دوم (کنترل) دارو پلاسبو مشابه روش گروه مداخله داده شده است. سپس بیماران ۲۴ ساعت پس از جراحی تحت نظر قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه برابر با $4/64 \pm 30/48$ سال بود. در گروه مداخله از ۷۶ نفر تنها ۲ مورد و در گروه کنترل از ۷۶ نفر ۱۳ مورد احتباس ادراری داشتند که درصد فراوانی احتباس ادراری از ۱۷/۱٪ به ۲/۶٪ کاهش یافت ($P=0/005$). ارتباط نوع بیهوشی در دو گروه مورد مطالعه با بروز احتباس ادراری، تفاوت آماری معناداری نداشت ($P>0/05$).

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که درمان کوتاه مدت با تامسولوسین می تواند بروز احتباس ادراری بعد از عمل و نیاز به کاتتریزاسیون پس از آن را کاهش دهد.

واژگان کلیدی: احتباس حاد ادراری، تامسولوسین، دارونما، سزارین